

## Spermogramme ou Spermoculture associée à un Spermogramme



**Recueil à réaliser uniquement sur rendez-vous au laboratoire :**

➤ Liste des sites réalisant ces demandes d'examen :

- **Site Commandant Maria à Cannes ;**  
*40 Boulevard de la République, 06400 Cannes  
Tél : 04.93.39.00.34  
Réalise les Tests de Migration Survie et les préparations en vue d'IAC*
- **Site Notre Dame (ROUDON) à Draguignan ;**  
*45 Avenue Pierre Brossolette, Clinique Notre Dame, 83300 Draguignan  
Tél : 04.94.67.46.69  
Réalise les Tests de Migration Survie et les préparations en vue d'IAC*
- **Site Millénium à Fréjus ;**  
*1373 Avenue de Provence, 83600 Fréjus  
Tél : 04.94.51.13.76*
- **Site Cavalaire à Cavalaire sur Mer ;**  
*Avenue des Alliés, Immeuble Le Caducée, 83240 Cavalaire-sur-Mer  
Tél : 04.94.64.00.98*

- Le recueil doit être réalisé de préférence le matin.
- **En semaine** sauf le samedi en cas de Test-Migration Survie.
- Après **2 à 7 jours** d'abstinence.
- La conjointe peut être présente si le patient le désire.
- En cas de spermoculture, boire 1 litre à 1,5 litre d'eau la veille au soir afin d'uriner le plus possible pour permettre une élimination de la flore urétrale saprophyte.
- Uriner aux toilettes avant d'entreprendre le recueil du sperme.
- Nettoyer soigneusement les mains au savon avant le recueil.
- Désinfecter soigneusement le gland, le méat, le sillon balano-préputial et le prépuce avec une lingette antiseptique.
- Prélèvement uniquement par masturbation.
- Recueillir le sperme directement dans un récipient stérile (fourni par le laboratoire exécutant).

### Cas particulier de la Spermoculture seule :

- Le recueil peut être réalisé au domicile du patient ou au laboratoire.
- Après **2 à 7 jours** d'abstinence.
- Boire 1 litre à 1,5 litre d'eau la veille au soir afin d'uriner le plus possible pour permettre une élimination de la flore urétrale saprophyte.
- Uriner aux toilettes avant d'entreprendre le recueil du sperme.
- Nettoyer soigneusement les mains au savon avant le recueil.
- Désinfecter soigneusement le gland, le méat, le sillon balano-préputial et le prépuce avec une lingette antiseptique.
- Prélèvement uniquement par masturbation.
- Recueillir le sperme directement dans un récipient stérile (fourni par le laboratoire exécutant).
- En cas de recueil réalisé au domicile l'échantillon doit être transmis au laboratoire dans la demi heure au maximum et à température ambiante.