

Le test respiratoire pour la recherche d'Helicobacter pylori est une méthode non invasive et très sensible de dépistage de cette bactérie responsable de gastrites chroniques, d'ulcères duodénaux ou gastriques.

Modalités de réalisation

Vous devez vous procurer sur prescription médicale un kit de prélèvement en pharmacie :
HELI-KIT® (Laboratoires Mayoli Spindler)

HELICOBACTER TEST INFAL® (Laboratoires Infai Sarl)

Vous devez vous rendre au laboratoire **strictement à jeun** depuis plus de 6 à 8 heures : sans boire, ni manger, ni fumer.

Délais à respecter avant la réalisation d'un test respiratoire

UN MOIS après l'arrêt de tout antibiotique

QUINZE JOURS après l'arrêt des médicaments anti-sécrétoires (IPP ou Anti -H2) :

A titre indicatif :

➤ IPP

Eupantol
Inexium
Inipomp
Lanzoprazole
Lanzor
Mopral
Ogast, Ogastoro
Omeprazole
Pariet
Zoltum

➤ Anti-H2

Azantac
Cimétidine
Famotidine
Nizaxid
Pepcidac
Pepciduo
Pepdine
Raniplex
Ranitidine
Stomedine
Tagamet ...

➤ Et aussi

Cytotec, Keal, Ulcar

24 HEURES après l'arrêt des pansements gastriques et des anti-acides :

Actapulgite

Bedelix

Gastropax

Gastropulgite

Gaviscon, Gavisconell

Gelox

Hépatoum

Isudrine

Maalox

Moxydar

Mutésa

Pepsane

Phosphalugel

Poly-karaya

Polysilane

Rennie

Rocgel

Smecta

Vous resterez au laboratoire pendant la durée du test : compter 45 minutes.

L'analyse sera réalisée par un laboratoire spécialisé, ce qui nécessitera un délai de 8 jours environ pour les résultats.

The breath test for diagnosing the presence of « Helicobacter pylori » is a non-invasive and very sensitive method of detection of these bacteria responsible for chronic gastritis, duodenal or gastric ulcers.

Modalities

You must bring with you a sampling kit that you can obtain on a medical prescription in pharmacies.

HELI-KIT® (Mayoli Spindler Laboratories)

HELICOBACTER TEST INFAL® (Infai Sarl Laboratories)

You must **not eat or smoke or drink anything** (including water) for 6 to 8 hours before the test.

Essential requirements to be respected before making a breath test

Up to ONE MONTH before the test, you must stop taking antibiotic ;

Up to FIFTEEN DAYS before the test, you must stop taking anti- secretory drugs (IPP ou Anti -H2) :

For indicative purposes :

➤ IPP

Eupantol
Inexium
Inipomp
Lanzoprazole
Lanzor
Mopral
Ogast, Ogastoro
Omeprazole
Pariet
Zoltum

➤ Anti-H2

Azantac
Cimétidine
Famotidine
Nizaxid
Pepcidac
Pepciduo
Pepdine
Raniplex
Ranitidine
Stomedine
Tagamet ...

➤ And also :

Cytotec, Keal, Ulcar

Up to 24 HOURS before the test, you must stop taking cytoprotective agents and antacids :

Actapulgate

Bedelix

Gastropax

Gastropulgite

Gaviscon, Gavisconell

Gelox

Hépatoum

Isudrine

Maalox

Moxydar

Mutésa

Pepsane

Phosphalugel

Poly-karaya

Polysilane

Rennie

Rocgel

Smecta

This test requires you to stay in the laboratory for the duration of testing : 45 minutes.

The analysis will be carried out by a specialized laboratory, which will require a period of approximately 8 days for the results.

الفحص التنفسي للبحث عن " *Helicobacter pylori* " هي عملية دقيقة و بسيطة للكشف عن الجرثومة المتسببة في التهابات المعدة المزمنة , قرحة الاثني عشر (duodénum) أو قرحة المعدة .

طريقة الإنجاز

هذا التحليل يستوجب عدّة خاصة يمكنك الحصول عليها بعد الاستظهار بوصفة طبيّة لدى الصيدلية.

HELI-KIT® (Laboratoires Mayoli Spindler)

أو

HELICOBACTER TEST INFAI® (Laboratoires Infai Sarl)

لإنجاز هذا التحليل ، عليك التوجه إلى مخبر التحاليل الطبية في حالة صيام كامل منذ مدة لا تقل عن 6 إلى 8 ساعات : من دون شرب أو اكل أو تدخين.

الإطار الزمّني الذي يجب احترامه قبل القيام بالاختبار التنفسي

-لإنجاز الاختبار التنفسي يجب احترام مدة :

- **شهر** منذ التوقف عن استعمال المضادات الحيوية (Antibiotiques)

- **15 يوما** منذ التوقف عن استعمال مضادات الإفراز (IPP ou Anti-H2) على سبيل المثال :

➤ IPP

Eupantol
Inexium
Inipomp
Lanzoprazole
Lanzor
Mopral
Ogast, Ogastoro
Omeprazole
Pariet
Zoltum

➤ Anti-H2

Azantac
Cimétidine
Famotidine
Nizaxid
Pepcidac
Pepciduo
Pepdine
Raniplex
Ranitidine
Stomedine
Tagamet ...

و أيضا :

Cytotec, Keal, Ulcar

- **24 ساعة** منذ التوقف عن استعمال أدوية تغليف المعدة (Pansements gastriques)

و مضادات الحموضة (Anti-acides) :

Actapulgite
Bedelix
Gastropax
Gastropulgite
Gaviscon, Gavisconell
Gelox

Hépatoum
Isudrine
Maalox
Moxydar
Mutésa
Pepsane

Phosphalugel
Poly-karaya
Polysilane
Rennie
Rocgel
Smecta

- عليك البقاء بالمخبر طوال مدة التحليل : ما يقارب 45 دقيقة.

- يتم إنجاز التحليل بمخبر مختص ممّا يستوجب أجلا ب8 أيام حسب التقريب للحصول على النتائج.